

Cartylis™ MODALITÀ D'USO

Bere 1 flaconcino al giorno preferibilmente prima di colazione, per 12 settimane.

Per ottenere risultati ottimali e più duraturi, il trattamento può essere ripetuto.



Non sostituisce una dieta varia ed equilibrata, o uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. L'eventuale presenza di particelle sul fondo del flacone è dovuta alla elevata concentrazione di ingredienti attivi e non preclude la qualità del prodotto. Per le donne in gravidanza o che allattano, si raccomanda di sentire il parere del medico.



A-CART-002-IT-23V01

aptissen >

Swiss Technology

Aptissen Italia S.r.l.

Tel: +39 02 3595 0714

info@aptissen.it

www.aptissen.it

WWW.CARTYLIS.COM/IT



CARTYLIS
ARTICULATION REBOOST

Drinkable food supplement

COLLAGENE IDROLIZZATO 10 G



Cartylis™, un integratore alimentare da bere con collagene idrolizzato, vitamina C, D, E e selenio.

Collagene idrolizzato (Tipo 1)	10 g	
Vitamina C	45 mg	900IU*
Vitamina D	5 µg	200IU*
Vitamina E	12 mg	17,9IU*
Selenio	27.5 µg	

Senza dolcificanti, glutine, coloranti artificiali
* Unità internazionale



Collagene

Componente strutturale di numerosi tessuti, tra cui ossa, cartilagine, tendini e pelle.



Vitamina C

Contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della cartilagine e delle ossa.



Vitamina D

Contribuisce al normale mantenimento delle ossa.



Vitamina E & Selenio

Contribuiscono a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Uno studio osservazionale di tre mesi ha mostrato che, in pazienti affetti da dolori articolari cronici, una dose giornaliera di Cartylis riduce significativamente il dolore e la rigidità già a 12 settimane.* La riduzione è stata ancora più pronunciata in pazienti con punteggi di dolore di base più alti.

77%

dei pazienti hanno avvertito un significativo miglioramento (n=112)*

55%

miglioramento del punteggio del dolore a riposo (n=58)*

36%

miglioramento del punteggio del dolore durante il movimento (n=94)*

42%

riduzione della rigidità articolare (n=85)*

Per i pazienti con sintomi moderati, punteggio VAS basale ≥ 30

Cartylis™ riduce il dolore articolare nei pazienti con osteoartrosi

Lo studio ha mostrato una significativa riduzione dell'intensità del dolore articolare sia a riposo che durante il movimento dopo 3 mesi di assunzione giornalieri di Cartylis™. La riduzione è stata osservata in tutta la popolazione ed è stata ancora più pronunciata nei pazienti con punteggio di dolore basale più alto.




Figura 1: Dolore al movimento. Pazienti con punteggio VAS basale ≥ 30



*Vidovic E, Rigaudier F, Juhel C (2023) Observational Study Evaluating the Efficacy and Safety of Cartylis Food Supplement in Patients Suffering from Chronical Joint Pain. J Nutraceuticals Food Sci Vol:8 No:1

Cartylis™ migliora la funzionalità articolare e riduce la rigidità

I pazienti hanno riferito, dopo 3 mesi di assunzione giornaliera di Cartylis™, una progressiva riduzione della rigidità articolare e un miglioramento della funzionalità articolare. Questo suggerisce che l'integratore può aiutare ad alleviare la disabilità funzionale associata ai dolori articolari cronici.




Figura 2: Evoluzione del punteggio VAS per la rigidità dall'arruolamento e 12 settimane (n=113).

Cartylis™ fornisce sollievo per dolori articolari cronici **a lungo termine** senza significativi effetti collaterali.

Lo studio ha dimostrato che l'integrazione con Cartylis™ è ben tollerata dai pazienti. Ciò indica che l'integratore è sicuro per l'uso a lungo termine, senza significativi effetti negativi.

Cartylis™ può ridurre, nei pazienti con osteoartrosi, la necessità di assumere analgesici e antinfiammatori.

Tra S4 e S12, il 68% dei pazienti non ha consumato né analgesici né antinfiammatori. Tra i consumatori, il numero di giorni al mese di consumo di farmaci tende a diminuire. Questo suggerisce che l'integratore può portare a ridurre la dipendenza dai farmaci.